

Pflanzenbau Aktuell Nr. 23/2018 Vorratsschutz und Lagerhygiene

In vielen Regionen hat bereits letzte Woche die Wintergerstenernte begonnen. Um Ihre Ernte auch im Lager gesund zu erhalten, sind regelmäßige Kontrollen vor und während der Einlagerungsphase unerlässlich.

In der Regel ist eine **sorgfältige Reinigung** mit einem Industriestaubsauger und/oder Hochdruckreiniger ausreichend, wenn im letzten Jahr kein Käferbefall stattgefunden hat. Falls jedoch ein Vorjahresbefall zu verzeichnen war bzw. Nachbargebäude befallen waren, ist eine Behandlung mit einem der unten aufgeführten Präparate dringend anzuraten.

Hinweis: Achten Sie auch beim Einsatz von Bioziden auf die **Aufzeichnungspflicht!**

Produkte für den Vorratsschutz/Lagerhygiene:

Insektizid/ Biozid	Wirkstoff- gehalt	zugelassene Aufwandmenge	Art der Anwendung
K-Obiol EC 25	25 g/l Deltamethrin	Leerräume: raue Oberfläche: 20-30 ml/5 l Wasser/50 m ² glatte Oberfläche: 40-60 ml/5 l Wasser/100 m ² Getreide (Förderstrom): bis 6 Monate Schutz: 1 l in 99 l Wasser/100 t Getreide bis 12 Monate Schutz: 2 l in 98 l Wasser/100 t Getreide	Behandlung in Gebäuden/Silos und gelagertem Getreide geg. Vorratsschädlinge – Imagines und Larven, die sich außerhalb von Pflanzenerzeugnissen befinden. Maximal 1x für die Kultur bzw. je Jahr.
Dedevap plus Nebel- automat	8 g/kg Pyrethrine	Käfer: 4 Dosen (500 ml)/666 m ³ Motten: 1 Dose (500 ml)/666 m ³	Einsatz in Mühlen und Speichern; in Anwesenheit v. Getreideerzeugnissen, Verarbeitungsprodukten von Ölsaaten: max. 3x geg. Motten, 1x geg. Käfer (WZ: 21 T.); Verarbeitungsprodukte von Schalen-, Trockenobst und Tabak: max. 3x geg. Motten, 1x geg. Käfer (WZ: F); offen lagerndes Getreide: 10x geg. Schafmottenfalter bzw. 3x geg. Käfer (WZ: 21 T.); Einwirkzeit: 6 Stunden
Microsol- pyrho SP- autofog	8 g/kg Pyrethrine	Käfer: 4 Dosen (750 ml)/1000 m ³ Motten: 1 Dose (750 ml)/1000 m ³	Einsatz in Mühlen und Speichern; in Anwesenheit v. Getreideerzeugnissen, Verarbeitungsprodukten von Ölsaaten: max. 3x geg. Motten, 1x geg. Käfer (WZ: 21 T.); Verarbeitungsprodukte von Schalen-, Trockenobst und Tabak: max. 3x geg. Motten, 1x geg. Käfer (WZ: F); offen lagerndes Getreide: 10x geg. Schafmottenfalter bzw. 3x geg. Käfer (WZ: 21 T.); Einwirkzeit: 6 Stunden
Talisma EC	80 g/l Cypermethrin 228 g/l Piperonyl- butoxid	Leerräume: raue Oberfläche: 60 ml/3,3-5 l Wasser/100 m ² glatte Oberfläche: 30 ml/3,3-5 l Wasser/100 m ² Getreide (Förderstrom): bis 12 Monate Schutz: 2 l in 10-250 l Wasser/100 t Getreide	Behandlung in Gebäuden/Silos und gelagertem Getreide geg. Vorratsschädlinge – Imagines und Larven, die sich außerhalb von Pflanzenerzeugnissen befinden. Maximal 1x für die Kultur bzw. je Jahr.

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG
Obere Mühle 2
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de
http://www.bausch-landesprodukte.de/