

Pflanzenbau Aktuell Nr. 28/2018 Unkrautbekämpfung in Winterraps – Nachauflauf (Herbst)

In vielen Regionen ist auf Grund der anhaltenden Trockenheit eine klassische VA-Behandlung im Winterraps unterblieben. Hier bietet sich noch eine Behandlung mit Kombinationen aus blatt- und bodenwirksamen Produkten bzw. **Tankmischungen im frühen Nachauflauf** (bis 2-Blatt-Stadium) an.

Produktauswahl zur Unkrautbekämpfung im frühen NA:

Behandlungsschwerpunkt	Herbizide	Aufwandmenge (l/ha)	Einsatzzeitraum (BBCH)	Gewässerabstand (m)	
				Abdriftminderung 0 (50, 75, 90) %	Hangneigung > 2 %
Mischverunkrautung + Kornblume	Fuego + Runway	1,0 + 0,2	bis 12	5 (5, *, *)	20
Mischverunkrautung + Kornblume + Klettenlabkraut	Fuego Top + Runway	1,33 + 0,2	10-18	5 (5, *, *)	20
Mischverunkrautung + Storchschnabel + Hirtentäschel	Runway Kombi Pack	2,5 + 0,2	NAH	5 (5, *, *)	20
	Tanaris + Runway	1,5 + 0,2	bis 18	5 (5, *, *)	5

*) länderspez. Gewässerabstand beachten

Ist schon ein Herbizideinsatz im Voraufbau erfolgt, kann mit einer **Nachbehandlung im 4- bis 6-Blatt-Stadium** nochmals korrigiert werden, vor allem bei einem hohen Druck an Storchschnabel, Stiefmütterchen und Rauke. Der Einsatz von Runway erfolgt schwerpunktmäßig nach der Vorlage von Butisan Gold, Fuego Top oder einer Clomazone-Anwendung. Die Unkräuter müssen bei der Behandlung alle aufgelaufen sein und dürfen von der Kultur nicht abgedeckt werden. Der optimale Anwendungszeitpunkt ist das 4-Blatt-Stadium des Rapses.

Produktauswahl zur Nachbehandlung im NA:

Behandlungsschwerpunkt	Herbizid	Aufwandmenge (l/ha)	Einsatzzeitraum (BBCH)	Gewässerabstand (m)	
				Abdriftminderung 0 (50, 75, 90) %	Hangneigung > 2 %
Stiefmütterchen, Taubnessel, Rauke-Arten	Fox	0,8	16-25	5 (*, *, *)	10
Hirtentäschel, Storchschnabel, Wegrauke	Fox	Splitting Abst.: 10-14 T. 0,3 / 0,7	14-16	5 (5, *, *)	20
Kamille, Kornblume, Klettenlabkraut	Effigo	0,35	NAH	* (*, *, *)	-
Kamille, Kornblume, Stiefmütterchen	Runway	0,2	NAH	* (*, *, *)	-

*) länderspez. Gewässerabstand beachten